

温泉分析書別表 (温泉分析書 No. 2537)

- 申請者住所氏名 鳥取県岩美郡岩美町岩井521番地
岩井温泉区温泉管理機構 代表理事 中島 隆敏
- 源泉名及び湧出地 鳥取県岩美郡岩美町岩井547番地2
岩井ゆかむり温泉 第一泉源
- 泉 質 カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉
(低張性 中性 高温泉)
- 泉質に基づく禁忌症、適応症は次のとおりである。
 - 浴用の禁忌症 温泉の一般的禁忌症
急性疾患 (特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中 (特に初期と末期)
 - 浴用の適応症 療養泉の一般的適応症
神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進
泉質別適応症
動脈硬化症、きりきず、やけど、慢性皮膚病
 - 飲用の禁忌症 泉質別禁忌症
下痢の時、腎臓病、高血圧症、その他一般にむくみのあるもの
 - 飲用の適応症 泉質別適応症
慢性胆嚢炎、胆石症、慢性便秘、肥満症、糖尿病、痛風
- 浴用、飲用の一般的注意事項は次のとおりである。
 - 浴用上の注意事項
 - 温泉療養を始める場合は、最初の数日の入浴回数を1日当たり1回程度とすること。その後は1日当たり2回ないし3回までとすること。
 - 温泉療養のための必要期間は、おおむね2ないし3週間を適当とすること。
 - 温泉療養開始後おおむね3日ないし1週間前後に湯あたり(湯さわり又は浴場反応)が現れることがある。「湯あたり」の間は、入浴回数を減じ又は入浴を中止し、湯あたり症状の回復を待つこと。
 - 以上のほか、入浴には次の諸点について注意すること。
 - 入浴時間は、入浴温度により異なるが、初めは3分ないし10分程度とし、慣れるにしたがって延長してもよい。
 - 入浴中は、運動浴の場合は別として一般には安静を守る。
 - 入浴後は、身体に付着した温泉の成分を水で洗い流さない(湯ただれを起こしやすい人は逆に浴後真水で身体を洗うか、温泉成分を拭き取るのがよい)。
 - 入浴後は湯冷めに注意して一定時間の安静を守る。
 - 次の疾患については、原則として高温浴(42℃以上)を禁忌とする。
高度の動脈硬化症、高血圧症、心臓病
 - 熱い温泉に急に入るとめまい等を起こすことがあるので十分注意をする。
 - 食事の直前・直後の入浴は避けることが望ましい。
 - 飲酒しての入浴は特に注意する。
 - 飲用上の注意事項
 - 飲用療養に際しては、温泉について専門的知識を有する医師の指導を受けることが望ましいこと。
 - 温泉飲用の1回の量は一般に100mlないし200ml程度とし、その1日の量はおおむね200mlないし1000mlまでとすること。
 - 強塩泉、酸性泉、含アルミニウム泉及び含鉄泉はその泉質と濃度によって減量し、又は希釈して飲用すること。
 - 以上のほか、飲用については次の諸点について注意すること。
 - 一般には食前30分ないし1時間がよい。
 - 含鉄泉、放射能泉及びヒ素又はヨウ素を含有する温泉は食後飲用する。含鉄泉飲用の直後には茶、コーヒーなどを飲まない。
 - 夕食後から就寝前の飲用はなるべく避けることが望ましい。

(注) この別表は、温泉法第18条による掲示に必要な参考資料です。